

Krople regeneracyjne (produkt kolekcjonerski) (glutation, DMSO, witamina C, B12)

To krople odżywcze dla oczu. Oryginalna receptura lekarska kropli do oczu na wczesne stadium zaćmy. Krople pomagają gdy zmiany w oczach to skutek działania wolnych rodników. Nie pomogą lub pomogą krótkotrwale jeżeli zmiany w oczach to skutek działania patogenów.

Stosujemy 4-6 razy dziennie po 1 kropli do oka. Nadmiar rozsmarowujemy na powiece. Zaraz po zakropieniu wykonujemy ćwiczenia jak na rysunku używając do tego sporej siły mięśni oczu.

Krople te przechowujemy w lodówce do czasu otwarcia. Po otwarciu lepiej przechowywać w lodówce ale nie jest to obowiązkowe. Najlepiej przechowywać je tak by stosować je często i codziennie. Dla skuteczności ważne jest by zużyć opakowanie jednym ciągiem.

Pamiętajmy iż przyczynowe odwrócenie stanu chorobowego zajmuje zazwyczaj 1/10 czasu, w którym dana choroba się rozwinęła. Jeżeli zaczniemy czuć poprawę to warto kontynuować odwracanie procesów wywołanych przez wolne rodniki.

Termin ważności 12 miesięcy, przydatności 6 miesięcy od otwarcia opakowania przechowywanego w lodówce.

Krople z karnozyną (produkt kolekcjonerski) (glutation, DMSO, witamina C, B12 i Karnozyna)

To krople odżywcze i silnie antyoksydacyjne. Muszą być przechowywane w lodówce. Stosowane w wielu schorzeniach oczu. Stosowanie takie jak w przypadku kropli regeneracyjnych


Termin ważności 6 miesięcy, przydatności 3 miesięcy od otwarcia opakowania przechowywanego w lodówce.

Krople z witaminą B12 (produkt kolekcjonerski) (glutation, DMSO, witamina C, 2% B12)

To krople stosowane przy uszkodzeniach rogówki i innych uszkodzeniach, zmianach anatomicznych w celu przyspieszenia gojenia. Stosowanie takie jak w przypadku kropli regeneracyjnych.

Termin ważności 12 miesięcy, przydatności 6 miesięcy od otwarcia opakowania przechowywanego w lodówce.

Po aplikacji każdych z kropli wykonujemy następujące ćwiczenia używając jak największego wysiłku.



Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na DMSO, soczewki reagujące z DMSO

Możliwe skutki uboczne:

Spotykane bardzo rzadko chwilowe zamglenie obrazu